



PRISE EN CHARGE D'UN ACCOUCHEMENT

Téléchargé sur <https://lavaiill.net>

© Dr Loïc LAVAILL 2014

| Paramètre | Cotation | | |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|
| | 0 | 1 | 2 |
| Fréquence cardiaque | < 80 /min | 80 à 100 /min | ≥ 100 /min |
| Cri | Néant | Faible | Vigoureux |
| Tonus | Néant | Extrémités | Normal |
| Réactivité | Néant | Grimaces | Vive |
| Coloration | Pâleur/Cyanose | Cyanose extrémités | Rose |

Score d'APGAR

Normalité : ≥ 7 à 1min, 10 à 5min et 10min – débuter les manœuvres de RCP si score ≤ 3

| Score | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Dilatation (cm) | 1 | 1 à 2 | 3 à 4 | 5 |
| Longueur (% effacement) | Long (0%) | 1/2 Long (40-50%) | Court (60-70%) | Effacé (≥ 80%) |
| Consistance | Ferme | Intermédiaire | Molle | |
| Position | Postérieure | Intermédiaire | Antérieure | |
| Hauteur de la tête | Haute et mobile | Amorcée | Fixée | Engagée |

Score de Bishop

Examen du col de l'utérus en cas de menace d'accouchement prématuré

| Cotation | 0 | 1 | 2 |
|------------------------------------|--------|----------|--------|
| Parité | 1 | 2 | ≥ 3 |
| Durée du travail | < 3h | 3 à 5h | ≥ 6h |
| Durée de la contraction | < 1min | 1min | ≥ 1min |
| Intervalle entre deux contractions | > 5min | 3 à 5min | ≤ 3min |
| Perte des eaux | Non | Récente | > 1h |

Score de Malinas A

≤ 4 : évacuation non-médicalisée – 5-6 : évacuation médicalisée – ≥ 7 : accouchement sur place

| Dilatation du col (en cm) | Parité | | |
|---------------------------|------------------------|-------|----------|
| | P1 | P2 | ≥ P3 |
| ≤ 5 | 4h | 3h | 1h30 |
| 5 à 7 | 2h | 1h | 30min |
| 7 à 9 | 1h | 30min | qqes min |
| ≥ 9 | ACCOUCHEMENT SUR PLACE | | |

Score de Malinas B

Examen du col de l'utérus en cas de menace d'accouchement prématuré

TV à réaliser si Malinas A ≥ 5